

EXAMEN SOUS CYCLOPLÉGIE (DILATATION PUPILLAIRE)

ATROPINE 0,3% / 0.5% collyre

1 goutte dans les deux yeux matin et soir pendant les 5 jours précédant la consultation et le matin de la consultation.

SKIACOL collyre/Non remboursé

1 heure puis 50 minutes puis 40 minutes avant l'heure de consultation, instiller une goutte dans chaque œil. (Au total, 2 gouttes à 10 minutes d'intervalle dans chaque œil).

TROPICAMIDE 0.5%

50 minutes puis 40 minutes puis 30 minutes avant l'heure de consultation, instiller une goutte dans chaque œil. (Au total, 3 gouttes à 10 minutes d'intervalle dans chaque œil).

- Appuyer sur le coin de l'œil (côté nez) pendant 1 minute après avoir mis la goutte dans l'œil pour éviter le passage de la goutte dans le nez où elle peut ensuite passer dans le sang.
- Fermer la paupière
- Essuyer sur la joue de l'enfant, la partie de collyre administré qui s'u écoulé.
- Ne mettre qu'une seule goutte à la fois
- Ne pas laisser le flacon à la portée des enfants. C'est très dangereux.
- Le (a) patient(e) aura des pupilles dilatées pour une durée de 7 à 10 jours pour l'ATROPINE, 12-24 heures pour le SKIACOL et 2-3 heures pour le TROPICAMID, après l'arrêt des gouttes, provoquant par la suite des troubles visuelles de près.
- **Lisez bien la notice.**
- En cas de rougeur du visage ou d'agitation : arrêt des gouttes et prendre contact avec le médecin.

MERCI DE BIEN RAMENER LA DOSETTE OU LE FLACON ENTAMÉE AVEC VOUS LE JOUR DE LA CONSULTATION